

## ¿CUÁNDO EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON DERMOCORTICOIDES?

En cuanto aparezcan los  
síntomas (enrojecimiento,  
picor, aspereza)

## ¿CUÁNDO INTERRUMPIR EL TRATAMIENTO CON DERMOCORTICOIDES?

En cuanto desaparezcan  
los síntomas



[WWW.FONDATIONECZEMA.ORG](http://WWW.FONDATIONECZEMA.ORG)

### \*\*Bibliografía:

Manjunatha Kalavala, Caroline M. Mills, Colin C. Long & Andrew Y. Finlay - Journal of Dermatological Treatment. 2007; 18: 319-320

C.C.LONG, C.M.MILLS AND A.Y.FINLAY - British Journal of Dermatology 1998; 138: 293-296

C.C.LONG AND A.Y.FINLAY - Clinical and Experimental Dermatotomy 1991; 16: 444 447"



Fundación  
Eczema

Fundación de empresa  
de los Laboratorios Pierre Fabre

*¿Cómo usar los dermocorticoides?*

La unidad falangeta de un adulto permite tratar una superficie de piel equivalente al tamaño de dos palmas de las manos de un adulto\*



0,5 g = 1 unidad falangeta



1 tubo de 30 g = una aplicación en todo el cuerpo de un adulto