




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

Ekzem oder atopische Dermatitis



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

Spielregeln

Geben Sie für jede der
folgenden Aussagen an, ob
es sich um eine richtige
(INFO) oder eine falsche
(INTOX) Information handelt.



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

1

Atopische Dermatitis ist
immer erblich bedingt



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INTOX

Atopische Dermatitis lässt sich durch mehrere prädisponierende Faktoren erklären, die zusammen oder getrennt wirken: Umwelt, genetische Veranlagung,

Außerdem spielt auch die Vielfalt der Mikrobiota auf der Hautoberfläche eine Rolle bei der Auslösung des Ekzems.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

2

Oft löst die Ernährung ein Ekzem aus



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INTOX

Ekzeme treten bei Babys häufig während der Abstillphase auf. Die Ernährung hat jedoch bei 80 % der Kinder nichts mit dem Ausbruch des Ekzems zu tun.

Manche Nahrungsmittelallergien treten bei atopischen Kindern auf, sind aber selten im Zusammenhang mit Ekzemen zu sehen.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

3

Die Verwendung von Dermokortikoiden zur Behandlung des atopischen Ekzems ermöglicht es, die Lebensqualität des Kindes zu erhalten.



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INFO

Bei üblicher Dosierung dringen Dermokortikoide nicht in die Haut ein und hemmen daher nicht das Wachstum.

Sie ermöglichen eine Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und Familien, indem sie die Symptome des atopischen Ekzems lindern. Insofern fördern sie eine normale Entwicklung des Kindes.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

4

Ekzeme heilen im
Erwachsenenalter immer ab.



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION


Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

INTOX

Während die meisten Fälle von atopischem Ekzem bei Kindern auftreten und vor der Pubertät abheilen, kann das Ekzem in weniger als 20 % der Fälle auch im Erwachsenenalter andauern.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

5

Es ist notwendig, zur
Behandlung eines atopischen
Ekzems eine Kortisoncreme zu
verwenden.



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INFO

Ärztinnen in Frankreich und weltweit empfehlen den Einsatz von Dermokortikoiden als beste Behandlungsmethode für atopische Ekzeme bei Babys und Kindern.

Außerdem muss die Textur der Dermokortikoide an das Erscheinungsbild der Läsion und die Patientenpräferenz angepasst werden.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

6

Die tägliche Bekämpfung von
Hauttrockenheit ist wichtig



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INFO

Ekzeme treten in Verbindung mit trockener Haut auf, was auf einen Defekt der Schutzschicht der Haut hindeutet.

Zur Reparatur dieser ist es erforderlich, systematisch eine weichmachende Pflege zu verwenden.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

7

Bei einem neuen Ekzemschub sollte so schnell wie möglich die Behandlung mit Dermokortikoiden wieder begonnen werden, auch wenn der Schub sich in Grenzen hält.



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

INFO


Man kann sich das Ekzem wie ein Feuer vorstellen. Die Entzündung der Haut und die Flammen eines Hausbrandes sind beide ein Notfall.

Das Dermokortikoid sollte sofort eingesetzt werden, um die Entzündung zu begrenzen und ihre Ausbreitung zu verhindern.

Dermokortikoide können auch auf nässender Haut angewendet werden, auch wenn es sinnvoller ist, sie vor dieser Phase anzuwenden.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

8

Dermokortikoide können
bei Babys unter 6 Monaten
angewendet werden.



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INFO

Ekzeme bei Babys beginnen häufig vor dem sechsten Lebensmonat. Es gibt keinen Grund, die Anwendung einer wirksamen Behandlung zu verzögern. Dermokortikoide (DK), die eine Standardbehandlung gegen Entzündungen darstellen, sind daher unumgänglich und sollten bei Bedarf schon im Säuglingsalter auf die Ekzemplaques aufgetragen werden.

DK können auch auf die Hände eines Kleinkindes aufgetragen werden, das am Daumen lutscht, da die Cremes im Mundbereich nur minimal eindringen und das Risiko gleich null ist.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

9

Weichmachende Pflege
beschreibt Cremes, die die
Barriere, die die Haut bildet,
reparieren.



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INFO

Bei trockener Haut kommt es zu einem Wasserverlust nach außen, aber auch zu einem verstärkten Eindringen von reizenden Fremdstoffen oder Allergenen.

Daher ist es wichtig, täglich eine weichmachende Pflege aufzutragen, um die Barriere der Haut zu stärken, die dann gegenüber der Umwelt undurchlässiger ist.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

10

Dermokortikoide können sich negativ auf das Wachstum auswirken.



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INTOX

Dermokortikoide dringen nur minimal in den Körper ein und haben daher nicht die Wirkung von oral eingenommenen Kortikoiden.

Dermokortikoide, die zur Behandlung von Ekzemen in der vorgeschriebenen Dosierung auf die Haut aufgetragen werden, verursachen keine allgemeinen Wirkungen.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

11

Beim Auftragen von
Dermokortikoiden sind
Vorsichtsmaßnahmen zu
beachten.



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INFO

NÜTZLICHE Vorsichtsmaßnahmen:

- Gelegentlich und in Maßen in die Sonne gehen, wenn man ein Dermokortikoid (DK) anwendet, oder mit einem wirksamen Sonnenschutz ausgestattet sein.
- Gesichtsekzeme mit einem mäßigen oder verdünnten DK behandeln (die Haut im Gesicht und insbesondere um die Augenlider herum ist dünner und daher empfindlicher).

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

12

Dermokortikoide begünstigen Infektionen



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INTOX

Dermokortikoide (DK) begünstigen keine Infektionen. Vielmehr sind es der Juckreiz und das Kratzen, die zu Superinfektionen der Ekzemwunde führen.

Wenn jedoch eine Infektion (Impetigo, Herpes ...) auftritt, wird die Anwendung von DK vorübergehend ausgesetzt.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

13

Dermokortikoide verursachen einen Gewöhnungseffekt



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INTOX

Von Gewöhnung spricht man, wenn ein korrekt angewendetes Dermokortikoid (DK) nicht mehr zu wirken scheint, obwohl es zu Beginn der Behandlung wirksam war. Dieses Phänomen ist selten und keineswegs systematisch. In diesem Fall sollte ein Arzt/eine Ärztin um Rat gefragt werden.

Auch eine falsche Anwendung des DK (unregelmäßiges oder unangemessenes Auftragen, zu frühes Absetzen der Behandlung usw.) kann dazu führen, dass die Wirkung nachlässt, was nicht verwechselt werden sollte!

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

14

Dermokortikoide begünstigen Asthma



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

INTOX


Asthma hängt nicht mit
der Anwendung von
Dermokortikoiden zusammen.

Bei Patienten mit Ekzemen
ist das Risiko, an Asthma zu
erkranken, dreimal höher.

Allerdings verlaufen diese beiden
Krankheiten unterschiedlich:
Ekzeme treten bei Babys und in
der frühen Kindheit auf, während
Asthma oft erst nach dem dritten
Lebensjahr auftritt.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG




PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

15

Wenn Sie die Dermokortikoide absetzen, besteht die Gefahr, dass ein Ekzemschub ausgelöst



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre


INTOX

Dieses Phänomen, das auch Rebound genannt wird, wird ausgelöst, weil die Behandlung nicht lange genug durchgeführt wurde.

Sie müssen warten, bis die Entzündung der Haut vollständig abgeklungen ist (7 bis 10 Tage), um das Risiko eines Rebounds zu vermeiden.

Zurück

Weiter



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre



Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

Besonderer Dank gilt den Autoren:

Dr. David Feldman


Apotheker Universitätsklinik de
Nantes

Prof. Jean-François Stalder

Atopieschule
Universitätsklinik Nantes

Alexine Mahé

Apothekerin



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

ZUSAMMENFASSUNG: DERMOKORTIKOIDE

- Bei einem Ekzemschub muss die Entzündung der Haut behandelt werden, da sie sich sonst verschlimmern oder weiter infizieren kann.
- Für die wirksame Behandlung eines Ekzems ist eine lokale entzündungshemmende Therapie unerlässlich: Dermokortikoide sind als erste Wahl unumgänglich.
- Dermokortikoide sind seit über 50 Jahren bekannte Medikamente, deren Risiken evaluiert wurden und sich in Grenzen halten.
- Lokale Komplikationen können auftreten: Sie sind jedoch selten und treten bei unsachgemäßem Gebrauch auf, z.B. Atrophie der Gesichtshaut bei längerer täglicher Anwendung.
- Dermokortikoide unterscheiden sich von Kortikoiden, die oral oder durch Inhalation angewendet werden. Ihre Absorption durch die Haut ist bei den vorgeschriebenen Mengen sehr gering.
- Bei den üblichen Dosierungen wurden keine Nebenwirkungen, insbesondere auf das Wachstum von Kindern, beobachtet.
- Das vom Arzt/der Ärztin verschriebenen Cremes müssen entsprechend aufgetragen werden, wenn sie Wirkung zeigen sollen.



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

ZUSAMMENFASSUNG: HYGIENE

- Bevorzugen Sie kurze, lauwarme Bäder und tupfen Sie sich trocken
- Baden Sie am besten alle zwei Tage, aber es geht auch täglich
- Bevorzugen Sie rückfettende Seifen ohne Duftstoffe
- Benutzen Sie in den Ruhephasen weichmachende Pflege ohne Duftstoffe, in der am besten geeigneten Form
- Bevorzugen Sie Baumwollkleidung
- Schneiden Sie die Etiketten heraus



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION


Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre

Verweis auf Aussage Nr. 11

INFO

ÜBERTRIEBENE VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Dermokortikoid (DK) mit Handschuhen auftragen (an den Händen, wo die Epidermis sehr dick ist, besteht keine Gefahr des Eindringens)
- So wenig DK wie möglich auftragen (dabei die vom Arzt/der Ärztin verschriebene Menge an Creme zur Behandlung des Ekzems verwenden)
- DK bei schwarzer Haut vermeiden um Verfärbungen zu verhindern (dies tritt sehr selten auf und ist immer nur vorübergehend)



WWW.PIERREFABREECZEMAFUNDATION.ORG



PIERRE FABRE
Eczema
FOUNDATION

Fondation d'Entreprise
des Laboratoires Pierre Fabre